

Баяк И.В.

Об одной математической конструкции многомерного космоса

Резюме: Установлено, что геометрия наблюдаемого евклидова пространства, алгебры Паули и Дирака, а также группы внутренних симметрий стандартной модели и модели так называемого большого объединения калибровочных взаимодействий логически следуют из геометрических построений 8-мерного вакуума и 9-мерного космоса.

Прежде всего, покажем, что классические алгебры Клиффорда являются групповыми алгебрами подгрупп циклических стрелочных подстановок. Пусть $I = \{1, \dots, n\}$, тогда имеем простое отражение $O: I \rightarrow I: i \rightarrow i^\circ: \{1, \dots, i, \dots, n\} \rightarrow \{n_{(1)}, \dots, i_{(i)}^\circ, \dots, 1_{(n)}\}$. Пусть также здесь и всюду далее $I = \{1, \dots, 2^m\}$, $J = \{1, \dots, m\}$, тогда существует такое разбиение семейства I на подсемейства, что $\forall k \in J$ имеем $I^k \equiv \{I_j^k\}_{(2^{k-1})}$, где $\bigcap_{(2^{k-1})} I_j^k = \emptyset$, $\bigcup_{(2^{k-1})} I_j^k = I$, $\forall j \in \{1, \dots, 2^{k-1}\}$ ($\text{card}(I_j^k) = 2^{m-k+1}$), и определена индукция, так что каждое I_{j+1}^k заполняется последовательной выборкой из I вслед за I_j , причем $I_1^k = \{1, \dots, 2^{m-k+1}\}$. В свою очередь, для такого I^k существует отображение k -отражения, а именно $k \circ: I \rightarrow \{O(I_j^k)\}_{(2^{k-1})}$.

Далее пусть всякая подстановка p из группы подстановок P задается множеством биективных переходных пар $(i, j): i \rightarrow j$, т.е. $p = \{(i, j) \mid \forall i \neq i'(j \neq j'), \forall j \neq j'(i \neq i')\}_{i, j \in I}$. Выделим из этой группы множество циклических подстановок $b = \{(i, j)(j, i) \mid \forall i \neq i'(j \neq j')\}_I$; тем самым $b^2 = e$, где e - тождественная подстановка, а $\{b\}$ - множество циклических подстановок и только. Если же $bp \equiv \{(i, j), (j, i), (i^\circ, j^\circ), (j^\circ, i^\circ) \mid i \neq j, \forall i \neq i'(j \neq j')\}_I$, то $bP = \{bp\}$ - группа циклических подстановок. Вместе с тем, если $bp(k) \equiv \{(i, j) \mid (i, j) \in bp, j = i^{k \circ}\}_I$, то $\{bp(k)\}_J$ - генераторы группы циклических подстановок, т.е. $bP = \langle \{bp(k)\}_J \rangle$, причем $\forall k_1 \neq k_2$ ($bp(k_1)bp(k_2) = bp(k_2)bp(k_1)$), так что $\forall bp_1 \neq bp_2$ ($bp_1bp_2 = bp_2bp_1$).

Далее пусть всякая подстановка $\bar{p}$ из группы стрелочных подстановок $\bar{P}$, где $P < \bar{P}$, задается множеством знако-переходных пар, т.е. $\bar{p} = \{(i, \pm j) \mid \forall i \neq i'(j \neq j'), \forall j \neq j'(i \neq i')\}_{i, j \in I}$. Тогда, если $b\bar{p} \equiv \{(i, j), (j, -i), (i^\circ, j^\circ), (j^\circ, -i^\circ) \mid i \neq j, \forall i \neq i'(j \neq j')\}_I$, то имеем $b\bar{P} = \{b\bar{p}\}$ - группу циклических стрелочных подстановок, где $b\bar{p}^2 = -e$. В свою очередь, если $b\bar{p}(k) \equiv \{(i, \pm j) \mid$

$(i, \pm j) \in b\bar{p}, j = i^{k_0}\}_J$, то $\{b\bar{p}(k)\}_J$ - генераторы группы циклических стрелочных подстановок, т.е. $b\bar{P} = \langle \{b\bar{p}(k)\}_J \rangle$, причем $\forall k_1 \neq k_2 \quad (b\bar{p}(k_1)b\bar{p}(k_2) = -b\bar{p}(k_2)b\bar{p}(k_1))$, так что $\forall b\bar{p}_1 \neq b\bar{p}_2 \quad (b\bar{p}_1b\bar{p}_2 = -b\bar{p}_2b\bar{p}_1)$.

Таким образом, поскольку свойства генераторов группы циклических стрелочных подстановок соответствуют требованиям, предъявляемым к генераторам классической алгебры Клиффорда, а именно $e_i e_j + e_j e_i = -2\delta_{ij} \cdot 1$, где $i, j \in J$, то групповая алгебра над R с базисом $b\bar{P}$ изоморфна именованной алгебре, т.е. $Rb\bar{P} \approx Cl(2^m)$. Вместе с тем, если для структурных отношений генераторов алгебры Клиффорда потребовать выполнения условия $e_i^2 = 1$, то наряду с классической алгеброй следует рассматривать и алгебру $Rb\hat{P} \approx Cl(2^{m-1}, 2^{m-1})$, где $b\hat{P} = \{b\hat{p}\} = \langle bp(1), \{b\bar{p}(k)\}_{J \setminus 1} \rangle$.

Далее заметим, что $\langle b\bar{p}(k) \rangle \approx P^+(2)$, т.е. циклическая группа, порожденная произвольным генератором циклических стрелочных подстановок, изоморфна подгруппе четных стрелочных подстановок 2-го порядка. В свою очередь, для циклической группы, порожденной генератором $bp(1)$, имеем изоморфизм $\langle bp(1) \rangle \approx P^+(1,1)$, где $P^+(1,1)$ - подгруппа четно-составных стрелочных подстановок 2-го порядка. Отсюда немедленно следует, что $b\bar{P} < P^+(2^m)$ а $b\hat{P} < P^+(2^{m-1}, 2^{m-1})$, и поэтому $Cl(2^m) \subset RP^+(2^m) \approx End E(2^m)$ а $Cl(2^{m-1}, 2^{m-1}) \subset RP^\pm(2^{m-1}, 2^{m-1}) \approx End E(2^{m-1}, 2^{m-1})$, где $E(2^m)$, $E(2^{m-1}, 2^{m-1})$ - соответствующие евклидовы пространства.

Обратимся теперь к алгебрам физического мира, а именно, к алгебрам Паули и Дирака, которые изоморфны алгебрам $Cl(4)$ и $Cl(4,4)$ соответственно, причем первая алгебра Клиффорда действует в 4-мерном евклидовом пространстве, а вторая – в 8-мерном псевдоевклидовом пространстве. Если данному изоморфизму придать определенный физический смысл, тогда необходимо будет коренным образом поменять представление о геометрии физического вакуума. Действительно, обычно геометрию пустого пространства сопоставляют с геометрией наблюдаемого 3-мерного евклидова пространства, но если распространить микроструктуру Вселенной на ее макроструктуру, тогда необходимо дополнительно к этой обычной ассоциации применить в первом приближении геометрию $E(4)$, а во втором приближении – геометрию $E(4,4)$. В свою очередь, геометрия $E(4)$ обусловлена факторизацией R^4 в S^4 , а геометрия $E(4,4)$ - факторизацией R^8 в $S^4 \times S^4$, и поэтому постулируем еще одну конструкцию вакуума, а именно, расслоение с базой $E(3)$ и типичным слоем S^4 или $S^4 \times S^4$.

Продолжая анализ глобальных физических симметрий, обратимся к группам $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$, $SU(5)$, которые описывают идеальные симметрии соответственно стандартной модели и модели так называемого большого объединения калибровочных взаимодействий. При этом в действительности имеет место нарушение идеальных симметрий до группы $SU(3) \times U(1)$. Предположим также, что на самом деле всякая физическая унитарная группа $SU(n)$ должна быть расширена до группы $SO(2n)$, так что геометрическим

источником физических симметрий служит орбита действия $SO(2n)$ в R^{2n} , т.е. сфера S^{2n-1} . В связи с этим нелишне будет напомнить, что овеествление группы $SU(n)$ является подгруппой $SO(2n)$, и что $S^n \approx R^n / ZH_n^+$, причем $End S^n \approx End E(n) = RP_n^+$ и $Aut S^n \approx Aut E(n) = SO(n)$, где $ZH_n^+ < Z^n$ а RP_n^+ - групповая алгебра над R с базисом P_n^+ - подгруппой четных стрелочных подстановок n -го порядка. Возвращаясь к геометрическим источникам идеальных физических симметрий, заметим, что $S^5 \oplus S^3 \oplus S^1 < S^9$ (т.к. $R^5 \oplus R^3 \oplus R^1 = R^9$, но $ZH_5^+ \oplus ZH_3^+ \oplus 2Z < ZH_9^+$), и поэтому предметом нашего поиска должно быть такое линейное преобразование факторпространства S^9 , в результате которого сохраняется симметрия S^5, S^1 и нарушается симметрия S^3 . Однако, поскольку эндоморфизмы евклидовых пространств совпадают с эндоморфизмами сфер (представленных факторпространствами) и $E(9) = E(5) \oplus E(3) \oplus E(1)$, то требуется найти такой эндоморфизм $E(9)$, который сохранит автоморфизмы подпространств $E(5), E(1)$ и нарушит группу автоморфизмов подпространства $E(3)$. Так, например, эндоморфизм подобия с коэффициентами α, β и 1, заданный матрицей $diag[\alpha, \alpha, \alpha, \alpha, \alpha, \beta, \beta, \beta, 1]$, оставляет инвариантными и $E(5)$ и $E(3)$ и $E(1)$. Если же в качестве линейного преобразования f пространства $E(9)$ принять отображение, заданное матрицей F ,

$$F \equiv \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \beta & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \chi & \chi & \chi & 1 \end{pmatrix},$$

тогда $E(9)$ содержит инвариантные относительно f подпространства $E(5), E(1)$ с ограничением $f(E(5)), f(E(1))$, являющимся эндоморфизмом подобия с коэффициентом 1 и α соответственно, а также потенциально инвариантное (при условии $\chi = 0$) подпространство $E(3)$ с ограничением $f(E(3))$, являющимся эндоморфизмом подобия с коэффициентом β . Тем самым, настоящий выбор F гарантирует связь стандартной модели теоретической физики с евклидовой геометрией, производной от унитарных симметрий.

Таким образом, математическое соответствие между геометрическими источниками симметрий и унитарными группами коренным образом меняет представление о геометрии физического космоса. Действительно, обычно унитарные симметрии связывают с микрокосмосом, однако если их отнести к космосу в целом, то возникает необходимость рассмотреть конструкцию

космоса, основанную на геометрии 9-мерной сферы, а именно, расслоение с базой $E(3)$ и типичным слоем S^9 .

В заключение заметим, что наблюдаемое 3-мерное евклидово пространство, которое является базой и вакуумного и космического расслоений, формально может быть факторизовано в 3-сферу и вложено в типичный слой этих расслоений. В свою очередь, вакуумное расслоение вкладывается в космическое, причем $S^4 \times S^4$ глобально минимально в S^9 , и поэтому можно предположить, что оно эволюционирует к абсолютно минимальному в S^9 подпространству S^8 . В целом, можно также полагать, что вакуумное расслоение - это всего лишь абстрактная формализация 8-мерного слоения с типичным слоем, обертывающим $S^4 \times S^4$, заданного в 9-мерной сфере, подвергнутой вышеуказанному эндоморфизму. Аналогично, можно полагать, что наблюдаемое евклидово пространство – это абстрактная формализация 3-мерного слоения, вложенного в вакуумное слоение и обертывающего 3-сферу в каждом своем слое.